

Nachsorgeempfehlung Pankreaskarzinom

(Das Dokument wurde im Vergleich zur Vorversion umfassend überarbeitet.)

Gemäß Leitlinie kann ein strukturiertes Nachsorgeprogramm beim Pankreaskarzinom stadienunabhängig nicht empfohlen werden.

Wir haben für unser Zentrum folgende Vorgehensweise definiert:

- Wiedervorstellung in der Klinik nach OP, sobald adjuvante Therapie möglich.
- danach dann Tumornachsorge in vierteljährlichem Abstand für 2 Jahre, danach in halbjährlichem Abstand für 3 Jahre, dann in jährlichem Abstand lebenslang.
- Bei palliativen Therapiekonzepten werden therapeutische Maßnahmen und Verlaufskontrollen individuell festgelegt

Therapieansatz:

Kurativ (nach Resektion).

Allgemein:

Ein standardisiertes Nachsorgeschema existiert nicht.

Bei eingeschränkten Therapieoptionen im Falle eines Rezidivs symptombezogen.

Nachsorgemaßnahme	Intervall	Dauer
- Anamnese, körperliche Untersuchung, Gewicht	alle 3 Monate	1. und 2. Jahr
- ggf. Labor mit CA 19-9	alle 6 Monate	3.-5. Jahr
- ggf. Sonographie Abdomen/CT Abdomen	jährlich	nach dem 5. Jahr