

Nachsorgeempfehlung kurativ Akute Leukämie

Patientenname
Geburtsdatum
(Aufkleber)

Akute Myeloische Leukämie (AML), Akute Lymphatische Leukämie (ALL)

Therapieansatz: kurativ

Allgemein: Es erfolgt eine klinische und hämatologische Nachsorge, um Rezidive frühzeitig zu entdecken. Dafür sind regelmäßige klinische Vorstellungen sowie Blutbildkontrollen notwendig. Knochenmarkuntersuchungen sind nur im Falle von Blutbildauffälligkeiten oder klinischem Verdacht auf Rezidiv indiziert.
(In ausgewählten Situationen erfolgt eine gezielte Untersuchung des Knochenmarks auf „minimale Erkrankung“; in diesem Fall erhält der Patient automatisch einen Termin im Onkologischen Zentrum).

Nachsorgemaßnahme	Intervall	Dauer
Anamnese, körperliche Untersuchung, Differential-Blutbild	alle 3 Monate	1. und 2. Jahr
<u>Bei Rezidiv-Verdacht oder auffälligem Blutbild:</u> Knochenmarkpunktion	alle 6 Monate	3.-5. Jahr
	jährlich	nach dem 5. Jahr

Quellen: DGHO-Leitlinie 2019, ESMO guidelines 2013, 2020